

FOLIAR GOLD AMINO

BIOESTIMULANTE APLICACIÓN FOLIAR

COMPOSICIÓN

Ácido aspártico	0.91 % p/p	Tirosina	0.51 % p/p
Ácido glutámico	1.67 % p/p	Valina	0.57 % p/p
Serina	0.20 % p/p	Metionina	0.24 % p/p
Histidina	0.57 % p/p	Fenil alanina	0.42 % p/p
Treonina	1.29 % p/p	Isoleucina	0.40 % p/p
Glicina	3.52 % p/p	Leucina	0.59 % p/p
Arginina	0.08 % p/p	Lisina	0.44 % p/p
Alanine	1.72 % p/p		

Aminoácidos totales: 13.12 p/p = 16.92 p/v

Formulación: Líquido Soluble

Olor: Agradable Característico

Solubilidad: Altamente Soluble al agua.

Almacenaje y manipulación: Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

QUÉ ES FOLIAR GOLD AMINO

Es un fertilizante foliar líquido para aspersiones foliares o radicales, para cualquier tipo de cultivo. Es un poderoso Bioestimulante para alto rendimientos de sus cultivos, proporciona ahorro de energía a la planta ya que facilita la utilización de Nitrógeno que la planta ha tomado del suelo. Mejora los procesos de enraizamiento, floración, cuajado y llenado de frutos. Eleva la resistencia de la planta a stress de tipo bióticos o abióticos proporcionándole al vegetal tolerancia para la escases o exceso de agua, bajas temperaturas, ataque de plagas y enfermedades, auxilia a su cultivo en casos de fitotoxicidad por el uso excesivo o mal uso de algún agroquímico. Se puede aplicar en cualquier tipo de cultivo



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
Corp S.A.

FOLIAR GOLD AMINO

FERTILIZANTE FOLIAR

PRESENTACIONES

Envase de 1 Litro

MODO DE EMPLEO:



La utilización de FOLIAR GOLD AMINO en los cultivos permite obtener plantas vigorosas, incrementando su rendimiento y sistema inmunológico. Actúa ahorrando energía a los cultivos, en la síntesis de las proteínas que formaran los órganos reproductivos y de sostén de la planta. Incrementa el potencial del rendimiento, la calidad de las cosechas, aumentando el contenido de las proteínas, azúcares, elevando los grados BRIX del fruto. Reduce la incidencia de plagas y enfermedades. Incrementa la resistencia al estrés. En aplicaciones a semillas, estimula la germinación y el brotamiento vigoroso y uniforme. Su solubilidad es 100% lo que le otorga una gran estabilidad y homogeneidad del producto disuelto.

INSTRUCCIONES DE USO

FOLIAR GOLD AMINO.- Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o en cualquier momento que sea necesario, luego de sufrir, stress hídricos o cuando es necesario mejorar masa radicular, es ideal para quelatar foliares a base de sales y/o otros estimulantes; incide directamente en la absorción de nutrientes. Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siempre con el sistema de agitación en funcionamiento.

CULTIVO	DOSIS	Época de aplicación	Forma de aplicación
MAIZ (<i>Zea mays</i>)	0.50 l/ha Volumen de agua 200 l/ha	Aplicar en la etapa vegetativa	Aplicación foliar, realizar dos aplicaciones
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	1.00 l/ha Volumen de agua 300 l/ha	Macollo, desarrollo y prefloración	Aspersión foliar, cada 30 días, 3 repeticiones
BANANO (<i>Musa acuminata</i> AAA)	2.00 l/ha Volumen de agua 100 l/ha	Etapa reproductiva y producción	Aspersión foliar y drench (hasta 4 l), cada 45 días
CACAO (<i>Theobroma cacao</i>)	1.50 l/ha Volumen de agua 300 l/ha	Reproducción y cuaje	Aspersión foliar cada 3 meses
TOMATE RIÑÓN (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	1.00 l/ha Volumen de agua 300 l/ha	Fase desarrollo y reproductiva	Aspersión foliar cada 25 días por 3 repeticiones
CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>)	1.00 l/ha Volumen de agua 300 l/ha	Prefloración y formación de bulbos	Aspersión foliar cada 25 días por 3 repeticiones
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	1.00 l/ha Volumen de agua 300 l/ha	Desarrollo y prefloración	Aspersión foliar cada 15 días
ROSAS (<i>Rosa sp.</i>)	2.00 l/ha Volumen de agua 1000 l/ha	Brotación, desarrollo y prefloración	Aspersión foliar y/o sistema de fertirrigación, cada 21 días

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos ácidos; se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de su aplicación.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.