

# EN CULTIVOS FRUTALES



# JESS FIX

## ESPARCIDOR PENETRANTE

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

ETER FENOL POLIGLICÓLICO.....170 g/L

**Registro Magap: 033911290**

**Formulación:** Líquido Soluble

**Olor:** Agradable

**Solubilidad:** Altamente soluble en agua.

**Almacenaje y manipulación:** Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas de temperatura durante su almacenaje. Agítase antes de usar.

## QUÉ ES JESS FIX?

**JESS FIX** Es un Coadyuvante de productos fitosanitarios, formulado como Líquido Soluble (SL), a base de Éter Fenol Poliglicólico al 17%, actúa disminuyendo la tensión superficial de las gotas de aspersión, mejorando la adherencia y dispersión de los agroquímicos aplicados vía foliar.

Protege a las moléculas contra el lavado de lluvias leves, y de los rayos ultravioletas del sol que degradan rápidamente los ingredientes activos de los diferentes pesticidas.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM**<sup>®</sup> Corp S.A.  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

# JESS FIX

## ESPARCIDOR PENETRANTE



### MODO DE EMPLEO:

**JESS FIX.** - Actúa como emulsificante, penetrante y humectante, disminuyendo la tensión superficial de las gotas de aspersión, su especial fórmula facilita la adherencia de las moléculas, evitando así el lavado por lluvias.

Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o con cualquier pesticida utilizado para la protección de los cultivos.

Llene hasta la mitad el tanque de aspersión adicione, regulador de ph, los agroquímicos a emplear, enrace el tanque.

Se recomienda realizar premezcla de la dosis recomendada de JESS FIX en 10 litros de agua y luego aplicar al tanque.

### PRESENTACIONES

Envase de 100 ml  
Envase de 250 ml  
Envase de 1 litro  
Tambor de 200 litros

### INSTRUCCIONES DE USO

La dosis para varios cultivos es de 1.25 a 1.50 cc por litro de agua.

| CULTIVO                                                                | DOSIS            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ALGODÓN</b>                                                         | 250ml - 600ml/Ha |
| <b>ARROZ</b>                                                           | 250ml - 600ml/Ha |
| <b>SOYA Y FRÉJOL</b>                                                   | 250ml - 600ml/Ha |
| <b>HORTALIZAS</b><br>Tomate, pimiento,<br>col, lechuga, sandía, melón. | 250ml - 600ml/Ha |
| <b>MAÍZ Y SORGO</b>                                                    | 250ml - 600ml/Ha |
| <b>PALMA AFRICANA</b>                                                  | 250ml - 600ml/Ha |
| <b>PAPA</b>                                                            | 250ml - 600ml/Ha |
| <b>PASTO</b>                                                           | 250ml - 600ml/Ha |
| <b>ROSAS</b>                                                           | 250ml - 600ml/Ha |



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM**<sup>®</sup>  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.





**ACTIMEC®** es un Fertilizante, potente Activador Metabólico, que favorece el desarrollo vegetativo de la planta, con brotación de yemas viables y hojas funcionales.

### ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Fósforo soluble (P2O5)   | 117.0 g/L    |
| Potasio (K2O)            | 119.0 g/L    |
| Zinc (Zn)                | 33.5 g/L     |
| Azufre (S)               | 10.0 g/L     |
| Nucleótidos              | 32.0 g/L     |
| Ácido Fólico             | 25.0 g/L     |
| L-Cisteína               | 50.0 g/L     |
| Auxinas                  | 1600 ppm     |
| Citoquininas             | 2500 ppm     |
| Aminoácidos libres (18)  | 100.0 g/L    |
| Aminoácidos Totales (18) | 225.0 g/L    |
| Densidad a 20°C (g/ml)   | 1.3 +/-0.05  |
| pH en solución al 10%    | 3.59 +/-0.05 |

### BENEFICIOS DE USO

- » **ACTIMEC®** es un potente activador metabólico, con nucleótidos, citoquininas, ácido fólico y aminoácidos que incrementan la producción de los cultivos.
- » **ACTIMEC®** mejora el desarrollo vegetativo incrementando: brotación de yemas viables, estructuras florales, cuajado de frutos y maduración uniforme.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM** Corp S.A.  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA



## MODO DE ACCIÓN

**ACTIMEC®** es un potente Activador Metabólico, que contiene Nucleótidos, Ácido Fólico y Cisteína, entre otros, los cuales favorecen el desarrollo vegetativo de la planta, con brotación de yemas viables y hojas funcionales.

**ACTIMEC®** contiene Nucleótidos, Aminoácidos y en especial una alta concentración de L-Cisteína que favorecen la respuesta de la planta a los diferentes tipos de estrés.

Confiere además un fuerte efecto de resistencia de la planta frente a condiciones adversas como, sequía, heladas, exceso de frío o de calor, fitotoxidad, ataque de plagas, enfermedades, uso de agroquímicos, etc.

**ACTIMEC®** le permite a la planta ahorrar energía, favoreciendo la calidad y la cantidad de cosecha por periodos mas prolongados, con una mayor rentabilidad de la inversión.

**ACTIMEC®** incrementa la actividad metabólica de la planta con aumento en el contenido de sustancias proteicas, carbohidratos, vitaminas y hormonas de crecimiento, que conducen a un mayor desarrollo, mayor floración, mayor cuajado de frutos y mayor producción de las cosechas.

## PRESENTACIONES

Envase de 250 ml  
Envase de 1 Litro  
Envase de 3,785 Litros (Galón)

## RECOMENDACIÓN DE USO

**ACTIMEC®** se aplica a la dosis de: 250 a 500 cc/ha., dependiendo de la edad del cultivo.

Para un óptimo resultado, se recomienda realizar el análisis químico de suelo y/o foliar del cultivo y así determinar el número de aplicaciones.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM** Corp S.A.  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA




**FITODERMA®** es un Acondicionador Orgánico del suelo, formulado con extractos vegetales y microorganismos benéficos que favorecen la absorción de los nutrientes y el control de hongos patógenos presentes en el suelo.

### ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO MICROBIOLÓGICO

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Nitrógeno Total Orgánico (N) | 4.0 %                           |
| Proteína Total               | 25.0%                           |
| Carbono Orgánico Oxidable*   | 38.0%                           |
| Beta-glucanos                | 40.0%                           |
| <i>Trichoderma harzianum</i> | Mínimo: 1x10 <sup>8</sup> UFC/g |
| <i>Bacillus subtilis</i>     | Mínimo: 1x10 <sup>8</sup> UFC/g |
| Densidad (g/ML)              | 0,69 +/-0.05                    |

### BENEFICIOS DE USO

- » FITODERMA® Es también un acondicionador microbiológico del suelo, que gracias a su contenido de *Trichoderma Harzianum* y de *Bacillus Subtilis* controla microorganismos patógenos del suelo mejorando la sanidad de la planta.
- » Incrementa la concentración de las rizobacterias, (promotoras del crecimiento de las plantas), lo que se traduce en un incremento de la producción.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM**®  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.



## MODO DE ACCIÓN

**FITODERMA®** es un acondicionador orgánico del suelo, formulado con extractos vegetales que favorecen la absorción de los nutrientes presentes y aplicados.

También es un acondicionador microbiológico del suelo formulado con *Trichoderma harzianum* y *Bacillus subtilis*, cultivados en condiciones que incrementan su patogenicidad, ayudando eficazmente en el control de los patógenos del suelo.

**FITODERMA®** también está formulado con Beta-glucanos, que además de inducir resistencia sistémica en la planta, facilitan la colonización del *Trichoderma* y del *Bacillus*, mejorando la sanidad de la planta y del suelo.

**FITODERMA®** es un mejorador de la fertilidad de la rizósfera de la planta, ya que incrementa la concentración de las bacterias P.G.P.R, debido a su importante contenido de oligosacáridos tipo Beta-glucanos, lípidos y proteínas.

Puede ser aplicado foliarmente, gracias a su formulación, que facilita a sus componentes biológicos, el control eficaz de numerosas enfermedades de la parte aérea de la planta.

**FITODERMA®** contiene LÍPIDOS Y PROTEÍNAS, que tienen como función principal servir de alimento para los microorganismos contenidos en la formulación, una vez estos se encuentren en el suelo, facilitando su colonización.

## PRESENTACIONES

Funda de 500 gramos

## RECOMENDACIÓN DE USO

**FITODERMA®** se aplica a la dosis de:  
500 gr/ha (1 bolsa por hectárea).  
Las aplicaciones se deben repetir cada 8 días por un periodo mínimo de 3 semanas.

En desinfección de semilla se aplica:  
1 kilogramo por tonelada de semilla.



# FOLIAR VERDOL SL

## FERTILIZANTE FOLIAR O RADICULAR

| COMPOSICIÓN                    |                      |                                   |                  |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Macroelementos:                | NITROGENO TOTAL      | N                                 | 16%              |
|                                | FÓSFORO COMO         | P(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 16%              |
|                                | POTASIO COMO         | K(K <sub>2</sub> O)               | 12%              |
| Microelementos<br>Quelataados: | AZUFRE (en SULFATOS) | S                                 | g/litro<br>40,00 |
|                                | BORO                 | B                                 | 10,15            |
|                                | HIERRO               | Fe                                | 0,45             |
|                                | MANGANESIO           | Mn                                | 0,39             |
|                                | COBRE                | Cu                                | 0,22             |
|                                | ZINC                 | Zn                                | 1,15             |
|                                | MOLIBDENO            | Mo                                | 0,03             |
|                                | COBALTO              | Co                                | 0,01             |

**Formulación:** Líquido concentrado soluble

**Olor:** Agradable

**Solubilidad:** Soluble al agua.

**Almacenaje y manipulación:** Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas de temperatura durante su almacenaje.



## QUÉ ES FOLIAR VERDOL SL?

FOLIAR VERDOL SL.- Es un activador fisiológico de alta producción recomendado para todo tipo de cultivo.

Estimula los principales procesos fisiológicos en los diferentes cultivos tanto de ciclo corto, como perennes. Su composición a base de macro, micro nutrientes, vitaminas, ácidos húmicos y fitohormonas de origen natural, aseguran una equilibrada distribución nutricional dentro del vegetal.

- Maximiza la absorción de la solución del suelo a través de las raíces, mejora el vigor y desarrollo saludable de los cultivos.
- Mejora los procesos de fructificación y llenado de frutos.
- Es un producto amigable con el ambiente ya que es biodegradable.
- Este producto es de baja toxicidad, no es corrosivo y es biodegradable.
- Contribuye al desarrollo de la micro fauna benéfica de los suelos.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM**<sup>®</sup>  
Corp S.A.  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA



# FOLIAR VERDOL SL

FERTILIZANTE FOLIAR O RADICULAR

## PRESENTACIONES

Caneca de 5 Galones  
Envase de 1 Litro  
Envase de 500 ml

## MODO DE EMPLEO:

Es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes radicales, y se aplica vía foliar tan pronto como se hayan desarrollado las primeras hojas.  
Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o en cualquier momento que sea necesario mejorar el vigor y condición nutricional de los cultivos, se recomienda usar especialmente en las etapas de desarrollo y reproductiva



## INSTRUCCIONES DE USO

Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siempre con el sistema de agitación en funcionamiento.

| CULTIVO                                              | NOMBRE CIENTÍFICO                                                                                                    | DOSIS X 200 L de agua | ÉPOCA DE APLICACIÓN                                                                                                                               | FRECUENCIA DE APLICACIÓN                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRIGO - MAÍZ<br>AVENA - ARROZ                        | ( <i>Triticum aestivum</i> )( <i>Zea mays</i> )<br>( <i>Avena sativa</i> )( <i>Oryza sativa</i> )                    | 1.0 - 1.5 L           | Antes del macolamiento y al inicio de la formación de la espiga.                                                                                  | 2 - 3 veces por ciclo.                                                                                                           |
| PAPAS                                                | ( <i>Solanum tuberosum</i> )                                                                                         | 1.0 - 1.5 L           | 50 días después de la siembra y durante la floración.                                                                                             | 3 - 5 veces por ciclo.                                                                                                           |
| HORTALIZAS, TOMATE,<br>PIMIENTO, CEBOLLA,<br>BRÓCOLI | ( <i>Lycopersicon sculentum</i> )<br>( <i>Capsicum annum</i> )<br>( <i>Allium cepa</i> )( <i>Brassica oleracea</i> ) | 1.0 - 1.5 L           | En la etapa del semillero, 15-20 días después del trasplante la floración y cuaje.                                                                | 2 - 4 veces por ciclo.                                                                                                           |
| BANANO                                               | ( <i>Musa sp.</i> )                                                                                                  | 2.0 - 2.5 L           | Cualquier etapa del cultivo.                                                                                                                      | Aplicar cada 1 - 2 meses                                                                                                         |
| SANDÍA, MELÓN,<br>PEPINO, CALABACÍN                  | ( <i>Citrullus lanatus</i> ), ( <i>Cucumis melo</i> )<br>( <i>Cucumis sativa</i> )<br>( <i>Cucurbita maxima</i> )    | 1.0 - 1.5 L           | En la etapa del semillero, 15-20 días después del trasplante la floración y cuaje.                                                                | 2 - 4 veces por ciclo.                                                                                                           |
| FRUTALES,<br>CACAO, CAFÉ,<br>MANGO                   | ( <i>Theobroma cacao</i> ), ( <i>Coffea arabica</i> )<br>( <i>Mangifera indica</i> )                                 | 2.0 - 2.5 L           | Antes de la formación de botones florales.<br>Después del cuajado de frutos.<br>Durante el llenado de frutoso antes de la maduración fisiológica. | Se recomienda junto con la aplicación de los fertilizantes edáficos y foliares para mejorar la asimilación de los fertilizantes. |
| ORNAMENTALES,<br>ROSAS, GIASOL,<br>GHYPSOILLA        | ( <i>Rosa gallica</i> ), ( <i>Helianthus annuus</i> )<br>( <i>Ghyposifilla paniculata</i> )                          | 1.5 - 2.5 L           | Cualquier etapa del cultivo.                                                                                                                      | Aplicar cada 1 - 2 meses                                                                                                         |



# POLYMENORES®

**POLYMENORES®** es un fertilizante con los seis elementos menores que requieren las plantas, quelatados con Aminoácidos para una rápida asimilación.

## ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Magnesio (MgO)         | 27.4 g/L     |
| Azufre (S)             | 66.8 g/L     |
| Zinc (Zn)              | 45.7 g/L     |
| Boro (B)               | 31.2 g/L     |
| Hierro (Fe)            | 24.1 g/L     |
| Cobre (Cu)             | 2.3 g/L      |
| Manganeso (Mn)         | 10.7 g/L     |
| Molibdeno (Mo)         | 5.8 g/L      |
| Aminoácidos libres     | 26.0 g/L     |
| Aminoácidos Totales    | 52.0 g/L     |
| Densidad a 20°C (g/ml) | 1.38 +/-0.05 |
| pH en solución al 10%  | 4.01 +/-0.05 |

## BENEFICIOS DE USO

- » **POLYMENORES®** Contiene una alta concentración de los 6 *Elementos menores* en formulación líquida, que evita la limitación o pérdidas en la producción de las cosechas, ocasionada por la deficiencia de *Elementos menores*.
- » Mejora las condiciones nutricionales del cultivo, permitiendo un desarrollo y crecimiento uniforme.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM** Corp S.A.  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

# POLYMENORES®



## PRESENTACIONES

Envase de 250 ml  
Envase de 1 Litro,  
Envase de 3.785 litros (galón)



## MODO DE ACCIÓN

Los elementos menores son aquellos que las plantas necesitan en pequeñas cantidades, aún así, su deficiencia puede causar graves complicaciones en el crecimiento y desarrollo de las plantas, disminuyendo su producción.

**POLYMENORES®** es un fertilizante que contiene los seis elementos menores que requieren las plantas.

Los ingredientes de **POLYMENORES®** se encuentran quelatados con aminoácidos para asegurar una rápida absorción.

**POLYMENORES®** tiene una formulación especial que además de permitir una alta concentración de elementos menores les facilita su asimilación y su metabolismo interno.

**POLYMENORES®** mejora las condiciones nutricionales del cultivo, permitiendo un desarrollo y crecimiento uniforme con mayor aprovechamiento de la oferta hídrica y de la energía solar.

**POLYMENORES®** Evita la limitación o pérdidas en la producción de las cosechas, ocasionada por la deficiencia de algún(os) elemento(s) menor(es).

## RECOMENDACIÓN DE USO

POLYMENORES se aplica a la dosis de 1 L/ha.

Para un óptimo resultado, se recomienda realizar el análisis químico de suelo y/o foliar del cultivo y así determinar el número de aplicaciones.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM®** Corp S.A.  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA



**SOLUDRENCH®** es un fertilizante mineral eficaz para promover la formación y fortalecimiento de raíces, de igual manera estimula la rápida emergencia de la planta.

### ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nitrógeno Total (N)            | 63.0 g/L      |
| Fósforo soluble en agua (P2O5) | 101.0 g/L     |
| Potasio (K2O)                  | 1.8 g/L       |
| Carbono orgánico oxidable      | 100.0 g/L     |
| Boro (B)                       | 6.0 g/L       |
| Zinc (Zn)                      | 5.0 g/L       |
| Nucleótidos                    | 2.0 g/L       |
| Auxinas                        | 500 ppm       |
| Citoquininas                   | 1000 ppm      |
| Beta-glucanos                  | 125.0 g/L     |
| Densidad a 20°C (g/ml)         | 1.19 +/- 0.05 |
| pH en solución al 10%          | 4.78 +/- 0.05 |

### BENEFICIOS DE USO



- Mayor volumen de raíces.
- Mayor masa foliar
- Mayor sanidad de raíz, tallo y hojas.
- Mayor aprovechamiento de los fertilizantes aplicados.
- Mayor número de macollas efectivas.
- Mayor activación de los organismos del suelo



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM** Corp S.A.  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA





# SOLUDRENCH®



## PRESENTACIONES

Envase de 250 ml  
Envase de 1 Litro  
Envase de 3.785 litros (galón)

## MODO DE ACCIÓN

**SOLUDRENCH®** es un producto diseñado para mejorar y fortalecer el crecimiento del sistema radicular y también para estimular la emergencia de la parte aérea.

Contiene Fósforo soluble que facilita el rápido, vigoroso y sano desarrollo de la raíz.

Favorece la rápida emergencia de la parte aérea de la planta, para que ésta envíe los fotosintatos a la raíz para continuar con su desarrollo.

La acción balanceada de los componentes de **SOLUDRENCH®** suple los principales requerimientos nutricionales necesarios para la producción de raíces, generando gran cantidad de pelos absorbentes que son fundamentales en la capacidad de la planta para absorber nutrientes y agua.

**SOLUDRENCH®** contiene Extractos vegetales que son un importante aporte de materia orgánica en la rizosfera de la planta.

**SOLUDRENCH®** es un eficaz promotor de la formación y del volumen de raíces con mayor cantidad de pelos absorbentes.

Estimula la formación de un mayor número de macollas efectivas y una rápida emergencia de la parte aérea, con mayor masa foliar.

**SOLUDRENCH®** contiene Nucleótidos, que además de aportar energía, actúan como precursores de Citoquininas acelerando la división y multiplicación celular y también actúan como precursores de Giberelinas favoreciendo la elongación celular.

## RECOMENDACIÓN DE USO

**SOLUDRENCH®** Se aplica a la dosis de 1Lt/Ha.  
Se recomienda un mínimo de 2 aplicaciones.

Es ideal para acompañar las aplicaciones de productos biológicos, puesto que todos sus componentes proporcionan nutrientes a la planta y a los microorganismos dando como resultado un mayor desarrollo en menor tiempo.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM®** Corp S.A.  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA



**STARZYME®** es un Bioestimulante de origen vegetal que contiene Aminoácidos libres, Nucleótidos y Vitaminas; Esenciales para el incremento en la producción y una mejora en la sanidad del cultivo .

## ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Nitrógeno Orgánico (N)    | 60.0 g/L      |
| Fosforo asimilable (P205) | 20.0 g/L      |
| Potasio (K)               | 30.0 g/L      |
| Magnesio (MgO)            | 5.0 g/L       |
| Zinc (Zn)                 | 72.0 g/L      |
| Azufre (S)                | 43.9 g/L      |
| Boro (B)                  | 4.0 g/L       |
| Cobre (Cu)                | 11.0 g/L      |
| Hierro (Fe)               | 6.0 g/L       |
| Manganeso (Mn)            | 1.9 g/L       |
| Molibdeno (Mo)            | 1.0 g/L       |
| Nucleótidos               | 10.7 g/L      |
| Ácido Fólico              | 6.4 g/L       |
| Aminoácidos libres (18)   | 180.0 g/L     |
| Aminoácidos Totales (18)  | 360.0 g/L     |
| Densidad a 20°C (g/ml)    | 1.33 +/- 0.05 |
| pH en solución al 10%     | 3.94 +/- 0.05 |



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM** Corp S.A.  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA



## PRESENTACIONES

Envase de 250 ml  
Envase de 1 Litro  
Envase de 3.785 litros (galón)

## MODO DE ACCIÓN

**STARZYME®** es un bioestimulante de origen vegetal cuyo principal contenido corresponde al Protoplasma Celular de levadura, el cual contiene Aminoácidos libres, Nucleótidos y Vitaminas.

**STARZYME®** se ha enriquecido con los elementos menores: B, Zn, Cu, Fe, Mn y Mo, evitando así que la deficiencia de éstos, impida la máxima expresión genética de producción.

Al usar **STARZYME®** se obtiene un incremento en la producción y una mejora en la sanidad del cultivo y en la calidad de las cosechas.

**STARZYME®** combinado con VIROBAT potencializa el metabolismo celular y activa las defensas de la planta incrementando sanidad y producción.

**STARZYME®** contiene Nucleótidos, Aminoácidos y Vitaminas que activan el metabolismo de los todos los nutrientes asimilados por la planta, mejorando la sanidad y la producción.

Facilita la rápida formación de Fitohormonas, Auxinas, Citoquininas y Giberelinas, favoreciendo el buen desarrollo de la planta.

**STARZYME®** incrementa la retención de estructuras florales evitando el aborto, favoreciendo además el cuajado, el llenado y la uniformidad de los frutos.

## RECOMENDACIÓN DE USO

**STARZYME®** se aplica a la dosis de 250 a 500 cc/ha., dependiendo de la edad del cultivo.

Para un óptimo resultado, se recomienda realizar el análisis químico de suelo y/o foliar del cultivo y así determinar el número de aplicaciones.

# KRESSIDA

INSECTICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**ALPHA CYPERMETHRIN..... 100 g/l**  
**Xilene..... 82,90g/l**

**Registro Nacional: 6-I54/NA-CL1**

**Ingrediente Activo:** Alpha Cypermethrin 100 g/l

**Formulación:** Concentrado Emulsionable (EC)

**Estado Físico:** Líquido transparente

**Color:** Amarillo claro

**Olor:** Característico

**Densidad Relativa:** 0.89+-g/ml

**pH:** 5.0 - 6.5

**Explosividad:** No es explosivo.

**Inflamable:** Muy inflamable

**Corrosivo:** No es corrosivo

**Estabilidad en Almacenamiento:** Se garantiza la vida útil del producto durante el almacenamiento.



## QUÉ ES KRESSIDA?

Es un Piretroide sintético con actividad insecticida, no sistémico, actúa por contacto e ingestión.

Se caracteriza por su efecto de choque y baja persistencia. Tiene gran efecto de choque contra adultos y larvas y, secundariamente, contra huevos. Actúa sobre el sistema nervioso central y periférico a dosis muy bajas.

Especialmente usado para Mosca blanca en Tomate.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM**<sup>®</sup>  
Corp S.A.  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA



# KRESSIDA

INSECTICIDA AGRÍCOLA



## INSTRUCCIONES DE USO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO                                                 | PLAGA                                                        | DOSIS    | PC<br>(Periodo de<br>carencia) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>TOMATE</b><br>( <i>Lycopersicon<br/>esculentum</i> ) | <b>MOSCA BLANCA:</b><br>( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ) | 0.5 ml/l | 7 días                         |

\* Volumen de agua utilizado para la aplicación: 400 l/ha.

**RESTRICCIÓN DE USO:** Uso exclusivo para el control de mosca blanca, en el cultivo de tomate de riñón bajo invernadero.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Aplicar al momento que aparezca la plaga, considerando el umbral económico que es de 2 insectos por planta. Aplicar dos veces a intervalo de siete días, dependiendo de la intensidad del ataque.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas después de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Compatible con la mayoría de los plaguicidas comunes de uso agrícola, excepto con los de reacción ácida.

## PRESENTACIONES

Envase de 1 Litro  
Envase de 500 ml  
Envase de 250 ml  
Envase de 100 ml

## MODO DE EMPLEO:

**KRESSIDA** actúa por contacto e ingestión inactivando los músculos del insecto causando parálisis y su muerte.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Llenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria de KRESSIDA.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM**<sup>®</sup>  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA  
Corp S.A.

# NEDMECTINA

ACARICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**ABAMECTIN..... 18 g/l**  
N, N-dimethylformamide (DMF)... 124g/l

**Registro Nacional:** 6-A16/NA

**Grupo Químico:** Avermectin

**Formulación:** Concentrado Emulsionable (EC)

**Estado Físico:** Líquido

**Peso molecular:** 866.6 g/mol

**Color:** Negro

**Olor:** Inoloro

**Densidad Relativa:** 0,96 g/ml

**pH:** 4,67 a solución de 1%

**Explosividad:** No es explosivo.

**Inflamabilidad:** 150°C no inflamable

**Estabilidad en Almacenamiento:** Líquido estable y homogéneo bajo almacenamiento, sin depósito de materia visible en suspensión.



## QUÉ ES NEDMECTINA?

**NEDMECTINA** Tiene excelente actividad tras laminar lo que favorece para efectuar un control eficaz de ácaros y una gran variedad de insectos tales como áfidos, trips, larvas de lepidópteros, larvas de coleópteros, defoliadores, minadores de hojas, salta hojas, etc.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM**<sup>®</sup>  
Corp S.A.  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

# NEDMECTINA

ACARICIDA AGRÍCOLA



## PRESENTACIONES

Envase de 100 ml  
Envase de 250 ml  
Envase de 1 litro

## MODO DE EMPLEO:

Acaricida con acción estomacal y de contacto. Realizar dos aplicaciones con un intervalo de 14 días. Rotar aplicaciones con otro plaguicida para evitar el apareamiento de resistencia

Actúa estimulando la liberación de ácido y aminobutírico, que es un inhibidor neurotransmisor, por lo tanto produce la activación de los canales de cloruro.

Llenar el tanque de aplicación con agua hasta la mitad, agregar la cantidad indicada de NEDMECTINA. Mantener agitación constante. Completar con agua hasta completar el volumen de aplicación.

## INSTRUCCIONES DE USO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO                            | PLAGA                                             | DOSIS    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| PAPAYA<br>( <i>Carica papaya</i> ) | ÁCARO ROJO<br>( <i>Tetranychus cinnabarinus</i> ) | 0,2 l/ha |

**VOLÚMEN DE AGUA:** 400 l/ha

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas, salvo los productos que poseen reacción alcalina y metales pesados. Se recomienda realizar un ensayo previo.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**MÉTODOS DE APLICACIÓN:** La aplicación del producto será dirigida sobre el follaje cubriendo todos los órganos expuestos de la planta.

**PERIODO DE REINGRESO:** Esperar 24 horas para reingresar al área tratada.

**PERIODO DE CARENIA:** 14 días en el cultivo de papaya.

Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec



**GVM**<sup>®</sup>  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.

# GIBERACID

## REGULADOR DE CRECIMIENTO

Hormona estimulante para  
desarrollo vegetativo.

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno..... 400g/Kg  
Ácido Giberélico GA3..... 100g/Kg

**Registro Magap: 03391598**

**Formulación:** Polvo Soluble

**Olor:** Inoloro

**Solubilidad:** Altamente soluble en agua.

**Almacenaje y manipulación:** Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa.

## QUÉ ES GIBERACID ?

**GIBERACID** Es un regulador de crecimiento vegetal a base de Acido Giberelico (GA3), actúa estimulando la división y elongación celular, estimula el enraizamiento, acelera la floración y mejora notablemente la calidad de los frutos.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2  
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral  
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

**GVM**<sup>®</sup>  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.



# GIBERACID

## REGULADOR DE CRECIMIENTO



10 Gramos

### PRESENTACIONES

Envase de 10 Gramos

### INSTRUCCIONES DE USO

#### MODO DE EMPLEO:

Actúa regulando el crecimiento vegetativo de los brotes de las plantas, a través del alargamiento de las células y multiplicación de las mismas.

Actúa también induciendo la floración, inhibe la caída de flores y por ende indirectamente ayuda a incrementar el número de frutos.

De acuerdo a la dosis utilizada puede retardar o acelerar la maduración de ciertos frutos sin cambiar la calidad final de este, en especial de aquellos con altos contenidos de azúcares y carbohidratos.

Puede aplicarse en diferentes tipos de cultivos y en cualquier momento que sea necesario, siempre y cuando se cuente con un cultivo bien nutrido y sin stress de ningún tipo, en especial stress hídrico sea por exceso o falta de riego, se sugiere realizar las aplicaciones en compañía de Foliar Gold SL para aumentar la calidad y cantidad de la cosecha, en banano ayuda a reducir el tiempo de corte del racimo.

Dosis: Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siempre con el sistema de agitación en funcionamiento.

| CULTIVO         | DOSIS                   | FRECUENCIA DE APLICACIÓN                         | EPOCA DE APLICACIÓN                      |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Banano          | 20 - 30 g/Ha            | 3 a 4 aplicaciones por año                       |                                          |
| Arroz           | 20 g/Ha                 | Aplicar al embuche y llenado                     | Prefloración y floración                 |
| Maiz            |                         |                                                  |                                          |
| Papa            | 40g/Ha                  | Aplicar al primer aporque                        | Prefloración y floración                 |
| Frutilla        | En 200 L con 50-100 ppm | 45 días después del trasplante                   | Prefloración y floración                 |
| Mora            |                         |                                                  |                                          |
| Clavel          | En 10 L con 300ppm      | Cuando presente 6 pares de hojas visibles        | Prefloración y floración                 |
| Tomate          | 30 g/Ha                 | 2 aplicaciones cada 25 días                      | Floración                                |
| Maracuyá        | 50 g/Ha                 | 4 aplicaciones, (intervalos semanales)           | Antes de la floración, llenado de frutas |
| Naranja         |                         |                                                  |                                          |
| Tomate de árbol | En 200 L con 50-100 ppm | Cada 3 meses con 200L de agua con 25- 50 ppm     | Floración o brotación                    |
| Babaco          |                         |                                                  |                                          |
| Claudia         |                         |                                                  |                                          |
| Melón           | En 200 L con 50-100 ppm | Cada 3 meses con 200 Litros de agua con 25-50ppm | Floración o brotación                    |
| Sandía          |                         |                                                  |                                          |
| Pepino          |                         |                                                  |                                          |
| Fréjol          | 20 g/Ha                 | A los 35 días del cultivo                        | Floración                                |
| Cacao           | 30 g/Ha                 | Aplicar cada 3 meses                             | Floración                                |
| Piña            | 40 g /Ha                | Aplicar cada 15 días                             | Floración                                |
| Pastos          | 10 - 20 g/Ha            |                                                  | Después del corte                        |