

CAMPO-DIFE 250

FUNGICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

DIFENOCONAZOLE..... 250 g/l
Solvent Naphta (Petroleum)..... 699 g/l

Registro Nacional: 67-F22/NA

Grupo Químico: Triazole

Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)

Estado físico: Líquido

Olor: a Gasolina

Color: Café

Densidad: 1.06 g/ml

Solubilidad en agua: 15mg/l

pH: 7.7

Estabilidad: Estable en condiciones secas selladas y recipiente cerrado Hidrolítica mente estable.

Inflamabilidad: No inflamable

Descomposición térmica: Estable a 150 °C



QUÉ ES CAMPO-DIFE 250?

CAMPO-DIFE 250 es un Fungicida sistémico recomendado en el control preventivo y curativo de una amplia gama enfermedades en ornamentales. Con una novedosa actividad de amplio espectro, que protege el rendimiento y la calidad del cultivo, mediante aplicación foliar.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.

CAMPO-DIFE 250

FUNGICIDA AGRÍCOLA



PRESENTACIONES

Envase de 100 ml
Envase de 250ml
Envase de 1 Litro
Caneca de 20 Litros
Tambor de 200 litros

MODO DE EMPLEO:

CAMPO-DIFE 250 Tiene actividad preventiva, curativa y erradicante. Es absorbido rápidamente por las partes verdes de la planta y por lo tanto no se lava con lluvia. El movimiento en el interior de las hojas y ápices vegetativos es esencialmente translaminar y la traslocación acrópeta. El difenoconazole es un inhibidor de la desmetilación del esterol. Inhibe la biosíntesis del ergosterol de la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo.

RECOMENDACIONES DE USO: Para banano se puede aplicar en suspensión, solo aceite, o emulsión aceite-agua, usando un volumen de mezcla desde 11 hasta 15 l/ha.

PREPARACIÓN DE LA EMULSIÓN: Adicionar al tanque de mezcla, mientras se agita el aceite, el emulsificante al 1% del volumen de aceite a usar y luego la mitad del agua. Una vez hecha la emulsión agregar la dosis de CAMPO – DIFE 250 y posteriormente completar con el resto del agua, el volumen previsto, en constante agitación.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Período de carencia)
BANANO (<i>Musa acuminata</i> AAA)	SIGATOKA NEGRA (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> , var <i>difformis</i>)	20.0 ml/l 0.40 l/ha*	7 días

***VOLUMEN DE AGUA:** En Aplicación aérea se considera un gasto de agua de 20 litros de agua por hectárea. En aplicación terrestre considera un gasto de agua de 100 litros por hectárea.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: En banano, según evolución de la enfermedad. No exceder de 8 aplicaciones por año, rotando con productos de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO: Se debe esperar por lo menos 12 horas antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de fungicidas y fertilizantes de uso común, no es compatible con ácidos fuertes, álcalis, metales finos divididos, sulfuros. Se recomienda siempre comprobar, a través de un estudio, su compatibilidad con otros pesticidas.

Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec



GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
Corp S.A.