

FELIFULL 72

FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

CYMOXANIL 80 g/Kg
MANCOZEB 640 g/Kg
Etilentiourea - ETU.....3 g/Kg
Aditivos c.s.p.....1 Kg

Registro Nacional: 58-F29/NA

Grupo Químico: Cyano acetamideoxime /
Dithio-carbamates

Formulación: Polvo Mojable (WP): Los ingredientes activos del fungicida está en una proporción de 80 gramos por Kg de Cymoxanil y 640 gramos por Kg de Mancozeb de producto formulado peso/volumen.

Peso molecular: 198g/mol

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo



QUÉ ES FELIFULL 72?

FELIFULL 72 es un fungicida compuesto por mancozeb y cymoxanil que inhibe múltiples procesos celulares como la síntesis de ADN y ARN, la síntesis de aminoácidos, la respiración micelial, la síntesis de proteínas, el metabolismo de la uridina y la permeabilidad de la membrana. Reacciona e inactiva los grupos sulfhidrilo de los aminoácidos y enzimas de las células fúngicas, dando como resultado la alteración del metabolismo de los lípidos, la respiración y la producción de ATP.

Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec



GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
Corp S.A.

FELIFULL 72

FUNGICIDA AGRÍCOLA



PRESENTACIONES

Envase de 250 gramos

Envase de 500 gramos

MODO DE EMPLEO:

Previo a la preparación de la mezcla, verificar y regular el pH del agua hasta obtener un pH de 5.5, vierta la dosis recomendada del insecticida “FELIFULL 72” en la mitad de volume requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación. No guardé la mezcla, apliqué el mismo día de preparación. Coloque el envase del plaguicida en una superficie plana y ábralo con cuidado. Vierta el plaguicida con cuidado para evitar derrames o desprendimiento. No mezcle, cargue o limpie el equipo cerca de estanques, arroyos, pozos o zanjas, ya que el agua de enjuague que contiene plaguicidas puede rebozarse y derramarse entre estas fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE USO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Periodo de carencia)
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i> .)	LANCHA TARDÍA (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.50 Kg/ha*	7 días

*VOLUMEN DE AGUA: Se considera un gasto de agua de 200 litros por hectárea.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar por aspersión a las partes aéreas de las plantas cubriendo en forma homogénea todo el follaje, de acuerdo a la dosis establecida, en fase fenológica de desarrollo vegetativo como plaguicida sistémico y de contacto. Realizar 2 aplicaciones del fungicida con intervalos de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO: Se debe esperar por lo menos 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Puede mezclarse con la mayoría de los productos agroquímicos y fertilizantes existentes en el mercado, excepto aquellos con reacción fuertemente alcalina.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.