# **FELISTAR 280**

## FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

AZOXYSTROBIN...... 200 g/l CYPROCONAZOLE...... 80 g/l

Registro Nacional: 215-F6/NA

Formulación: Suspención concentrada (SC) Ingrediente activo: Azoxistrobin + Cyproconazole

Concentración: 200 g/l + 80 g/l Propiedades físicas y químicas:

**Peso molecular:** Azoxistrobin: 403.4 g Cyproconazole: 291.8 g

Aspecto, color: Líquido blanquesino

**pH:** 5.0 – 9.0

**Densidad :** 1090 ±30 g/L a 20 °C **Inflamabilidad:** No inflamable **Explosividad:** No es explosivo.

Persistencia a la espuma: 25 ml max después de 1

minuto.

Reactividad con el material de envase: No corrosivo. Estabilidad de almacenamiento: Estable durante al

menos 2 años en condiciones normales





### **QUÉ ES FELISTAR 280?**

Es un fungicida compuesto por Azoxystrobin que inhibe la respiración mitocondrial bloqueado la transferencia de electrones entre el citocromo b y el citocromo c1, en el sitio de oxidación del ubiquinol. Controla las cepas patógenas resistentes a los inhibidores de la 14 desmetilasa, las fenilamidas, las dicarboxamidas o los bencimidazoles y de Cyproconazole que inhiben la desmetilación de esteroides.

**Felistar 280** es recomendado en el cultivo de del Arroz para tratamiento de Quemazón o añublo.










## **FELISTAR 280**

## FUNGICIDA AGRÍCOLA



#### **INSTRUCCIONES DE USO**

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Periodo de carencia)
ARROZ (Oryza sativa)	QUEMAZÓN O AÑUBLO (Pyricularia oryzae)	625 ml/ha*	30 días

\*VOLUMEN DE AGUA: Se considera un gasto de agua de 300 litros / hectárea.

### **PRESENTACIONES**

Envase de 1 Litro Envase de 500 ml Envase de 250 ml Envase de 100 ml

#### **MODO DE EMPLEO:**

Previo a la preparación de la mezcla, verificar y regular el pH del agua hasta obtener un pH de 5.5. Vierta la dosis recomendada del fungicida "FELISTAR 280" en la mitad de volumen requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total.

Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación. No guarde la mezcla, aplique el mismo día de preparación.

Coloque el envase del pesticida en una superficie plana y ábralo con cuidado. Vierta el pesticida con cuidado para evitar que se derrame o desprendimiento.

No mezcle, cargue o limpie el equipo cerca de estanques, arroyos, pozos o zanjas, ya que el agua de enjuague que contiene pesticidas puede rebozarse y derramarse entre estas fuentes de agua.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN**: Por aspersión en las partes aéreas de las plantas cubriendo en forma homogénea todo el follaje. Realizar 2 aplicaciones con un internado de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO: Se deber esperar por lo menos 12 horas antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Puede mezclarse con la mayoría de los productos agroquímicos y fertilizantes existentes en el mercado, excepto aquellos con reacción fuertemente alcalina.







