

GUASON

FUNGICIDA AGRÍCOLA

AZOXYSTROBIN..... 200 g/Kg
DIFENOCONAZOLE..... 125 g/Kg

Registro Nacional: 143-F2/NA-CL2

Formulación: Gránulos Dispersables (WG)

Propiedades físicas y químicas:

Estado físico: Gránulos sólidos

Color: Blanco a Beige

Olor: Característico, ligero olor a Amina

Estabilidad de almacenamiento: Estable, sin embargo, se debe mezclar, almacenar y aplicar utilizando acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o de plástico forradas.

Densidad : 1,11 g/cm³

Punto de inflamación: No inflamable

pH: 3.5


Persistencia de la espuma: > 60 ml después de 1 minutos

Explosividad: No es explosivo.



QUÉ ES GUASON?

Fungicida con propiedades protectoras, curativas, erradicantes, translaminas y sistémicas. Especializado en el control de Sigatoka negra en cultivos de banano.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
Corp S.A.

GUASON

FUNGICIDA AGRÍCOLA



INSTRUCCIONES DE USO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Dosis (Kg/ha)	PC (Periodo de carencia)
BANANO (Musa acuminata AAA)	SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerella fijiensis, var difformis)	0.25	14 Días
MAÍZ (Zea mays)	MANCHA DE ASFALTO (Phyllachora maydis)	0.25	30 Días

VOLUMEN DE AGUA: 300 Litros de agua por Ha (Maíz)

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: GUASON se aplica dos ocasiones, en presencia de la plaga en el cultivo, con intervalos de 7 días.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con otros fungicidas, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO: Esperar 24 horas para reingresar al área tratada

PRESENTACIONES

Envase de 120 g
Envase de 250 g
Envase de 500 g
Saco de 25 Kg

MODO DE EMPLEO:

MECANISMO DE ACCIÓN:

GUASON inhibe en la germinación de esporas y el crecimiento micelial y muestra actividad antisporulante.

MÉTODOS DE APLICACIÓN: GUASON se debe aplicar en las partes áreas de las plantas de manera continua y uniforme mojando el área foliar.

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de GUASON, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

Modo de empleo para BANANO: Aplicar en emulsión agua - aceite a dosis de 6 litros de aceite agrícola por hectárea y emulsificador 1% del volumen de aceite usado, complete el volumen total con agua y agitar constantemente.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.