

KIFUNG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

MANCOZEB..... 800 g/Kg
Ethylene Thiourea..... 6 g/Kg

Registro Nacional: 1-F44/NA
Formulación: Polvo Mojable (WP)

Propiedades físicas y químicas:

Estado físico: Polvo

Color: Blanco a Amarillo

Olor: Sulforoso

Estabilidad de almacenamiento: Este material es estable bajo condiciones normales de temperatura y almacenamiento.

Densidad a granel (Suelto) : 30 lb/ pié cúbico

Densidad a granel(Empacado): 35 lb/ pié cúbico

Descomposición: Se descompone con el calor

Explosividad: No es explosivo.



QUÉ ES KIFUNG?

Es un fungicida protector de amplio espectro, actúa en forma preventiva. Es absorbido por las plantas, actúa por contacto y tiene acción protectora para varios cultivos.




Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.

KIFUNG

FUNGICIDA AGRÍCOLA



INSTRUCCIONES DE USO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (kg/ha)	PC (Periodo de carencia)
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	LANCHA TARDÍA (<i>Phytophthora infestans</i>)	4	14 días

Volumen de agua: 400 litros de agua por hectárea.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar al momento que aparezca la plaga considerando el umbral económico. Aplicaciones dos veces a intervalo de siete días dependiendo de la intensidad del ataque.

PERÍODO DE REINGRESO: El período de reingreso es de 12 horas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas comunes de uso agrícola, con excepción de productos de reacción ácida.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

PRESENTACIONES

Funda de 500 gramos

Funda de 1 Kilo

Saco de 25 Kilos

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza como tratamiento foliar y para semillas, para el combate de una amplia variedad de enfermedades fungosas en varios cultivos

Afecta múltiples procesos metabólicos de los hongos. Impide la actividad de las enzimas sulfhídricas y de la cisteína, causa una disrupción de la actividad respiratoria, irrumpe el ciclo de Krebs y la formación de ATP.

Vierta la dosis del producto **KIFUNG** en la mitad de agua requerida, agite constantemente, agregar el agua necesaria para completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

para el momento de la aplicación es recomendable realizar una dilución previa en envase de capacidad media, para luego verter esta pre mezcla en el tanque de dilución definitiva. Con esto se puede garantizar la formación de una buena suspensión.