

METANED

FUNGICIDA AGRÍCOLA

MANCOZEB..... 640 g/Kg
METALAXYL 80 g/Kg

Registro Nacional: 170-F20/NA-CL1

Grupo Químico: Fenilamida (Metalaxil-M);
Ditiocarbamato (Mancozeb)

Formulación: Polvo Mojable (WP)

Estado físico: Polvo

Olor: Agradable

Solubilidad: Totalmente soluble en agua

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

Estabilidad en Almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.

Garantía: El fabricante garantiza la estabilidad del producto por un mínimo de dos años después de la fecha de formulación.



QUÉ ES METANED?

METANED es un fungicida multisitio sistémico y de contacto, del grupo de las fenilaminas y acilalaninas.

METANED, inhibe la síntesis del ARN lo cual resulta en la no producción de esporas y en la inhibición del crecimiento del micelio del hongo. También actúa sobre las esporas, impidiendo su germinación o causándoles la muerte antes que el tubo germinativo haya penetrado en los espacios intercelulares.

Controla principalmente hongos de la familia peronosporales en el cultivo de papa.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec



GVM®
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.

METANED

FUNGICIDA AGRÍCOLA

500 gramos



250 gramos



PRESENTACIONES

Funda de 500 gramos

Funda de 250 gramos

MODO DE EMPLEO:

METANED.- Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o en cualquier momento que sea necesario combatir enfermedades fungosas en los cultivos.

Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siempre con el sistema de agitación en funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	PC (Periodo de carencia)
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	LANCHA: (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,5 Kg/Ha	14 días

***Volumen de agua: 400 litros/hectárea**

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Realizar dos aplicaciones con un intervalo de 7 días entre aplicación, con un 2% de incidencia en la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: Se debe esperar por lo menos de 24 horas antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: A la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas del crecimiento del cultivo.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de fungicidas, se recomienda hacer una prueba a pequeña escala en mezcla con otros productos.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.