

PARACAMPO-NIL 720

FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - (SC)

CHLOROTHALONIL 720 g/L

Registro Nacional: 18-F44/NA

Grupo Químico: Chloronitrile

Formulación: Suspensión Concentrada - (SC)

Nombre Químico: Tetrachloroisophthalonitrile

Estado físico: Líquido

Olor: Característico

Color: Blanco

Densidad Relativa: 1.34 g/ml a 20° C

Punto de inflamación: >73° C

pH: 5.0 - 9.0

Estabilidad: Estable a 0° C y 54° C. Vida útil es 2 años mínimo.

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo



QUÉ ES PARACAMPO-NIL 720?

PARACAMPO-NIL 720 es un fungicida foliar no sistémico de contacto, de amplio espectro de control, que posee acción protectora y preventiva. Previene la generación de resistencia. Es persistente en el cultivo y resiste el lavado por lluvias.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
Corp S.A.

PARACAMPO-NIL 720

FUNGICIDA AGRÍCOLA



PRESENTACIONES

Envase de 250 ml
Envase de 500 ml
Envase de 1 Litro
Caneca de 20 Litros
Tambor de 200 litros

MODO DE EMPLEO:

PARACAMPO-NIL 720 es fungicida foliar no sistémico con acción protectora. Conjugue el agotamiento de tioles (glutación particularmente) de las células fúngicas en germinación, lo que lleva a la interrupción de la glucólisis y la producción de energía, fungistático y acción fungicida.

MODO DE EMPLEO: Usar el equipo de protección adecuado (guantes, botas, mascarilla, overol, gorra, lentes protectores). En un recipiente con agua adicionar la dosis necesaria del producto a probar para cubrir el área de cada tratamiento. Agitar la mezcla durante cinco minutos. Verificar y regular el pH de la mezcla adecuado para el efecto (pH 5.5). Agregar agua a la bomba de mochila. Colocar la mezcla del producto en la bomba y completar con agua la cantidad necesaria.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Periodo de carencia)
CACAO (<i>Theobroma cacao</i> L.)	MONILIA (<i>Moniliophthora roreri</i>)	1.25 ml/l ó 0.50 l/ha *	14 días
PAPAYA (<i>Carica papaya</i> .)	ANTRACNOSIS (<i>Colletotrichum gloesporioides</i>)	0.6 l/ha**	7 días
BANANO (<i>Musa acuminata</i> AAA)	SIGATOKA NEGRA (<i>Mycosphaerella fijensis</i>)	1.50 l/ha***	1 día

***VOLUMEN DE AGUA:**

* Se considera un gasto de agua de 400 litros de agua por hectárea.

** Se considera un gasto de agua de 200 litros de agua por hectárea.

*** Se considera un gasto de agua de 100 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre y 20 l/ha de agua en aplicaciones aéreas

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: La aplicación se realiza por aspersión a las partes aéreas de las plantas cubriendo en forma homogénea todo el follaje. Aplicar por dos ocasiones con intervalos de 14 días en la fase fenológica de floración y fructificación como plaguicida preventivo y curativo.

PERIODO DE REINGRESO: Se debe esperar por lo menos 24 horas antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: No compatible con aceites. Incompatible con sustancias alcalinas. Evitar la mezcla con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.

Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec



GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.