

METSULFOZELL

HERBICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

METSULFURON METHYL 600 g /Kg

Registro Nacional: 72-H13/NA

Ingrediente activo: Metsulfuron Methyl 600g/Kg

Formulación: Polvo mojable

Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Polvo

Color : Blanco

Olor: Característico.

pH : (dispersión p/v al 1 %): 7 a 10

Punto de fusión: 162°C

Punto de ebullición: > 300°C

Explosividad: No explosivo.

Punto de inflamación: No inflamable

Estabilidad en el almacenamiento: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.



QUÉ ES METSULFOZELL?

METSULFOZELL 60 WP es un producto sistémico del grupo de las sulfonilureas. Es selectivo y se utiliza en el cultivo del arroz, pastizales, caña de azúcar y café. Se aplica en post-emergencia, para el control de las malezas de hoja ancha. **Metsulfozell 60 WP** inhibe rápidamente el crecimiento de la maleza susceptible como el botoncillo, la paja del arroz y cortadera, entre otros.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec



GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
Corp S.A.

METSULFOZELL

HERBICIDA AGRÍCOLA



PRESENTACIONES

Envase de 15 gramos

INSTRUCCIONES DE USO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS A CONTROLAR		DOSIS
	Nombre común	Nombre científico	
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Botoncillo	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk	0,04 g/l equivalente a 0,008 Kg/Ha en 200 litros de agua
	Cortadera	<i>Cyperus diffusus</i> Vahi.	
	Paja de arroz	<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link	

metabolismo, al interrumpir la síntesis proteica, e interfiere con la síntesis de ADN y el crecimiento celular, provocando la muerte de la planta.

METSULFOZELL 60 WP: para aplicaciones terrestres utilizar equipos de elevado o bajo volumen. Se deben utilizar boquillas de tipo abanico plano. Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentre en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Una sola aplicación. En el caso del arroz sólo se aplica una vez en el período desde los 10 hasta los 35 días de emergido el arroz.

PERÍODO DE REINGRESO: 12 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas en los cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD: **METSULFOZELL**, es compatible con la mayoría de productos recomendados para uso en el cultivo de arroz. Excepto con insecticidas organofosforados.

METSULFOZELL 60 WP actúa en preemergencia o postemergencia temprana de las malezas, es sistémico y selectivo. Se absorbe por las raíces y el follaje y se transloca por xilema y floema a los meristemos de las plantas. Actúa inhibiendo la actividad de la enzima acetolactato sintetasa. Esta acción desencadena una perturbación total del