

NICOSH

HERBICIDA AGRÍCOLA

NICOSULFURON..... 750 g/Kg

Registro Nacional: 80-H5/NA

Concentración del I.A. : 750 g/Kg - 75%

Formulación: Gránulos dispersables (WG)

Ámbito de aplicación: Campo abierto.

Color y olor: Gránulos beige, sólido, olor característico

Densidad: 0,758 g/cm³

pH: 3.68

Inflamación: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Dispersión en agua: 1%

Estabilidad en el almacenamiento: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento en el envase original por al menos dos años.



QUÉ ES NICOSH?

Herbicida selectivo de acción sistémica, que es absorbido por el follaje y las raíces, con rápida traslocación en el xilema y floema a los tejidos meristemáticos. Actúa inhibiendo la biosíntesis de los aminoácidos, deteniendo la división celular y crecimiento de la maleza.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.

NICOSH

HERBICIDA AGRÍCOLA



INSTRUCCIONES DE USO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS g/ha
MAIZ (Zea Mays)	LECHOSA (<i>Euphorbia hirta</i>)	45 g/ha
	ORTIGA (<i>Fleurya aestuans</i>)	
	GARRAPATILLA (<i>Peperomia pellucida</i>)	
	PASTO ILUSIÓN (<i>Panicum Trichoides</i>)	
	GUARDAROCÍO (<i>Digitaria Sanguinalis</i>)	
	ESCOBA DURA (<i>Sida acuta</i>)	
	PAJA BRAVA (<i>Paspalum paniculatum</i>)	
	RUELLIA (<i>Ruella brevifolia</i>)	

PRESENTACIONES

Envase de 16 gramos

MODO DE EMPLEO:

NICOSH se debe aplicar en las partes aéreas de las plantas, cubriendo de forma homogénea el follaje, además debe estar presente la maleza en el cultivo a tratar. Aplicar por una sola vez en el ciclo del cultivo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

En la premezcla: Mezclar la cantidad requerida de Nicosh en una pequeña cantidad de agua para obtener una "crema suave" sin ningún remanente de gránulos.

En la mezcla: Vierta en el tanque la preparación con la dosis recomendada de Nicosh, en la mitad de volumen de agua. Agite bien y complete el volumen de agua requerido. No guardar la mezcla aplicar el mismo día de su preparación.

PERIODO DE REINGRESO: Esperar 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada.

COMPATIBILIDAD: Compatible con otros herbicidas para ser aplicados como post emergentes se recomienda realizar mezclas a pequeña escala para garantizar compatibilidad.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.