

QUEMAQUAT 200

HERBICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

PARAQUAT 200 g/L

Registro Nacional: 7-H48/NA

Nombre común: PARAQUAT

Concentración del I.A. : 200 g/l

Formulación: Concentrado Soluble (SL)

Grupo químico: Bipyridylum

Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Líquido azul verde oscuro

Olor: Característico a piridina.

Explosividad: No explosivo

Inflamabilidad: No inflamable

pH: 5,0 – 8,0 (20°C)

Solubilidad en agua: Completamente soluble

Densidad: 1,040 – 1.080 g/ml

Estabilidad en el almacenamiento: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento en el envase original por al menos dos años.



QUÉ ES QUEMAQUAT 200?

QUEMAQUAT 200, es un Herbicida de contacto no selectivo, absorbido por el follaje, con cierta translocación en el xilema. Durante la fotosíntesis, se genera superóxido, que daña las membranas celulares y el citoplasma.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.

QUEMAQUAT 200

HERBICIDA AGRÍCOLA



PRESENTACIONES

Envase de 500 ml
Envase de 1 Litro
Envase de 1 Galón
Caneca de 2,5 Galones
Caneca de 5 Galones
Tambor de 200 litros

MODO DE EMPLEO:

Previo a la aplicación de la mezcla, verificar el pH del agua hasta obtener un pH de 5.5, vierta la dosis recomendada del herbicida **QUEMAQUAT 200** en la mitad del volumen requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total.

Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación. No guarde la mezcla, aplique el mismo día de la aplicación. Coloque el envase del pesticida en una superficie plana y ábralo con cuidado. Vierta el plaguicida con cuidado para evitar derrames o desprendimiento. No mezcle, cargue o limpie el equipo cerca de estanques, arroyos, pozos o zanjas, ya que el agua de enjuague que contiene plaguicidas puede rebozarse y derramarse entre estas fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE USO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Periodo de carencia)
BANANO (<i>Musa acuminata</i> AAA)	PASTO ILUSIÓN (<i>Panicum trichoides</i>) PAJA (<i>Panicum polygonatum</i>) JUSTICIA (<i>Justicia laevislinguis</i>) DRIMARIA (<i>Drymaria cordata</i>) BRACHIARIA (<i>Brachiaria decumbens</i>)	1 L/ha*	1 día

*VOLUMEN DE AGUA: 200 litros por hectárea

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Dirigir la aplicación por aspersión a la postemergencia de las malezas cubriendo en forma homogénea todo el follaje. Realizar una sola aplicación del plaguicida.

PERIODO DE REINGRESO: Se debe esperar por lo menos 24 horas antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con surfactantes concentrados. Agregar fomesafen a esta mezcla aumenta la probabilidad de incompatibilidad.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.