

SHYPER

INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

CYPERMETHRIN.....250 g/l

Registro Nacional: 006-179/NA

Formulación: Concentrado Emulsionable

Concentración del I.A.: 250g/L - 25%

Estado Físico: Líquido viscoso.

Color: Amarillo.

Olor: Ligero olor a jabón.

Densidad (g/ml): 0,9508 a 20°C

pH: 4.1

Punto de inflamación: >400°C

Estabilidad de la emulsión: Estable.

Corrosión: No corrosivo excepto con el Zinc.

Inflamabilidad: No inflamable

Incompatibilidad química: Con sustancias alcalinas,
las bases y los agentes oxidantes fuertes.



QUÉ ES SHYPER?

Es un insecticida no sistémico de contacto y acción estomacal.

SHYPER actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, y altera la función de las neuronas por la interacción del canal de sodio, pertenece al grupo de los Piretroides.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM[®]
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.

SHYPER

INSECTICIDA AGRÍCOLA



PRESENTACIONES

Envase de 100 ml
Envase de 250 ml
Envase de 500 ml
Envase de 1 Litro

MODO DE EMPLEO:

La aplicación aérea, es decir, debe aplicar en las partes aéreas de la planta, cubriendo en forma homogénea el follaje, se recomienda hacer 2 aplicaciones por cultivo.

Aplique SHYPER cuando en el muestreo exploratorio se detecte que un 30% de plantas con algún daño causado por la plaga y/o cuando ésta se encuentre atravesando el segundo y tercer estadio; es decir, cuando la larva tenga 1.0 cm o más.

INSTRUCCIONES DE USO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (ml/l)	PC (Periodo de carencia)
MAIZ (Zea mays)	Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda)	0.35*	30 días

*VOLÚMEN DE AGUA: 200 litros /ha.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Vierta en un tanque de preparación la dosis a utilizar de **SHYPER**, en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido.

Mantenga en agitación constante.

No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

PERÍODO DE REINGRESO: Esperar un mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No se espera efectos sucesivos, ya que el producto no se aplica ni se incorpora en el suelo.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y acaricidas, se recomienda hacer una prueba a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad.

Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec



GVM[®]
Corp S.A.
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA